



Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations au médecin. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Dénomination

ZOVIRAX[®] 800 mg, comprimé.

Composition quantitative et qualitative

Aciclovir.....800 mg
Excipients : Cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique (type A), povidone K30, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

Forme pharmaceutique

Boîte de 35 comprimés.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIVIRAUX A ACTION DIRECTE

Nom et adresse de l'exploitant

Laboratoire GlaxoSmithKline
100, route de Versailles - 78163 Marly-le-Roi Cedex

Fabriqué par :

Glaxo Wellcome, S.A.
Avenida de Extremadura 3
09400 Aranda de Duero - Burgos
Espagne

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un anti-viral.

Il est indiqué en cas de zona de l'œil, pour éviter les complications.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'antécédent d'allergie à l'aciclovir, ou à l'un des autres constituants du comprimé.

Précautions d'emploi

Prévenir votre médecin en cas d'insuffisance rénale connue, car les doses

devront dans certains cas être modifiées. En cas d'insuffisance rénale, il est recommandé de beaucoup boire.

Il ne faut pas donner ce comprimé chez l'enfant avant 6 ans, car il peut avaler de travers et s'étouffer.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, prévenez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Lorsque le traitement est prescrit pour une infection sévère ; l'allaitement doit être interrompu. Dans les autres cas, votre médecin pourra vous prescrire un traitement par voie locale.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

A titre indicatif, la posologie usuelle est de 5 comprimés par jour à répartir sur 24 heures à intervalles réguliers.

Le traitement doit être débuté dans les deux premiers jours après l'apparition des symptômes.

La posologie devra être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

Respecter des intervalles réguliers entre les prises.

Durée du traitement

La durée du traitement est habituellement de 7 jours.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Prévenir votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

Quelques éruptions cutanées bénignes régressant à l'arrêt du traitement ont été décrites.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées.

Troubles neuropsychiques : céphalées, sensations ébrieuses. Des troubles neurologiques parfois sévères et pouvant comporter confusion, agitation, tremblements, myoclonies, convulsions, hallucinations, psychose, somnolence, coma ont été rarement signalés : il s'agit habituellement d'insuffisants rénaux ayant reçu des doses supérieures à la posologie recommandée ou de patients âgés (cf. Rubrique Précautions d'emploi). Une régression complète est habituelle à l'arrêt du traitement.

La présence de ces symptômes peut être due à un surdosage, parlez en rapidement à votre médecin.

Troubles hépatiques : des augmentations réversibles de la bilirubine et des enzymes hépatiques sériques ont été rapportées.

Manifestations d'hypersensibilité et réactions cutanées : éruptions cutanées, urticaire, prurit et exceptionnellement dyspnées, œdèmes de Quincke et réactions anaphylactiques.

Troubles hématologiques : exceptionnels cas de thrombopénie et leucopénie.

Troubles rénaux : exceptionnellement augmentation de l'urée et de la créatinine sanguines et insuffisance rénale aiguë, notamment chez le sujet âgé ou insuffisant rénal en cas de dépassement de la posologie.

Effets divers : des cas de fatigue ont été parfois rapportés.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation

A conserver à une température inférieure à 30°C et à l'abri de l'humidité.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Février 2004



Le Laboratoire GlaxoSmithKline participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Il vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

1000000048870

