

Zovirax[®] 5% crème

aciclovir

tube de 2 g

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination

Zovirax[®] 5 % crème

Composition qualitative et quantitative

Aciclovir (exprimé en produit anhydre) 5,00 g
Excipients : diméticone 20, poloxamère 407, laurilsulfate de sodium, alcool cétostéarylique, vaseline, paraffine liquide, propylèneglycol, eau purifiée q.s.p. ... 100 g

Forme pharmaceutique et le contenu en poids

Crème. Tube de 2 g.

Classe pharmaco-thérapeutique

Antiviral pour usage local
(D : Dermatologie)

Nom et adresse de l'exploitant

Laboratoire GlaxoSmithKline
100 , route de Versailles
78163 Marly-le-Roi Cedex

Fabriqué par:

Glaxo Wellcome Operations
Harmire Road, Barnard Castle
County Durham DL12 8DT
Royaume Uni

TEXT FREE AREA
(REF. 2)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Manifestations de certaines infections herpétiques, notamment herpès labial, selon prescription médicale.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Antécédents d'allergie à l'aciclovir ou au propylèneglycol.

La composition de la crème contre-indique l'application directe dans la bouche, le vagin et tout particulièrement dans l'œil.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mise en garde spéciale

Ne pas appliquer sur l'œil.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

L'administration au long cours de l'aciclovir dans l'herpès récidivant de la femme enceinte n'est pas recommandée, en particulier en fin de grossesse, ni lors de l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.



Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Propylèneglycol.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

- 5 applications par jour, de façon répartie sur la journée ; par exemple :
 - le matin après le petit déjeuner,
 - à midi après le déjeuner,
 - vers 16 h - 17 h,
 - le soir après le dîner,
 - le soir avant le coucher.

Il est recommandé d'appliquer la crème en débordant largement autour de la lésion. Le traitement doit être débuté le plus tôt possible dès les premiers signes de l'infection.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Pour une efficacité rapide, débiter les applications dès les premières démangeaisons ou brûlures avant même que n'apparaissent les vésicules.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Durée du traitement

- La durée du traitement est comprise entre 5 et 10 jours.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

- Des sensations de picotements ou de brûlures transitoires peuvent suivre l'application de la crème.
- Chez quelques patients, la crème a induit un érythème (rougeur) ou une sécheresse de la peau.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION


Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Conserver le tube soigneusement fermé, dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Ne pas réfrigérer.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Octobre 2003.



(REF. 1)



Le Laboratoire GlaxoSmithKline participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Il vous demande en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

TEXT FREE AREA